

อาหารของแยะ



อาหารของแยะที่สำคัญ ได้แก่

- อาหารที่อยู่บนพื้นดิน เช่น กอหญ้าหรือต้นไม้มขนาดเล็ก มด ปลวก และต๊กแตน เป็นต้น



- อาหารที่อยู่ในดิน เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง กิ้งกือ และด้วง เป็นต้น



การอนุรักษแยะ

ปัจจุบันนี้ แยะถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากถูกล่าเพื่อนำมาประกอบอาหารอย่างหลากหลายและการนำมาเลี้ยง เนื้อแยะมีรสชาติอร่อยคล้ายเนื้อไก่ จนต้องมีการอนุรักษ รวมไปถึงการนำแยะมาเลี้ยงแทนที่จะปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติ

การเลี้ยงแยะ .. สามารถเลี้ยงในที่โล่งเพื่อการอนุรักษ หรือเลี้ยงเพื่อการค้าโดยเลี้ยงในบ่อปูนหรือโถง ใสดินให้ลึกพอที่แยะจะขุดรูเข้าไปอยู่อาศัยได้ โดยให้อาหารวันละครั้งในช่วงเช้า ได้แก่ หนอนนก ไส้เดือน ยอดอ่อนพืช

การขยายพันธุ์ .. แยะจะผสมพันธุ์ในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน วางไข่ 4-12 ฟอง ใช้เวลาฟัก 28-30 วัน จึงออกมาเป็นตัว ในช่วงเดือนมีนาคม

จัดทำโดย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมย่อย

การศึกษาชีววิทยาและจำนวนประชากรของแยะบริเวณเขาพลวง
เพื่อการขยายพันธุ์และอนุรักษ
ปีงบประมาณ 2566



อ.พ.สธ.-มรภ.พระนคร
ปีงบประมาณ 2566



การสำรวจแยะ..เพื่อการอนุรักษ

@ วิทยาลัยพยาบาลพิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.ลพบุรี



จัดทำโดย : ดร.วิราภรณ์ ภูนั้น และคณะ

“.. แยมี่ ..”

(Butterfly Lizard)

แยมี่ .. ชนิดที่พบในบริเวณเขตป่าอนุรักษ์เขาพลวง

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนา อำเภอยชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี คือ **แยมี่เส้น** อาจเรียกว่า แยมี่จุด แยมี่ผีเสื้อ หรือแยมี่ธรรมดา (Common butterfly lizard) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Leiolepis belliana* (Hardwicke & Gray, 1827) จัดอยู่ในวงศ์กิ้งก่า (Family Agamidae) วงศ์ย่อยแยมี่ (Leiolepidinae) ซึ่งในประเทศไทยพบแยมี่จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ *L. belliana*, *L. ocellata*, *L. boehmei* *L. reevesii*, *L. rubritaeniata*, *L. peguensis*, *L. triploida* และ *L. guttata*



แยมี่เพศผู้

- ลำตัวมีขนาดใหญ่ และยาวกว่าตัวเมีย
- พบอวัยวะ 2 คู่ บริเวณใกล้กับทวาร

- สีข้างลำตัวมีลายสลับของสีดำกับสีเหลืองหรือสีแดงเด่นชัด สีข้างลำตัวแผ่ และแบนออก

แยมี่เพศเมีย

- ลำตัวมีขนาดเล็ก และสั้นกว่าตัวผู้
- สีข้างลำตัวมีสีแดงอ่อน ไม่มีลายดำสลับ
- ลำตัวมีลักษณะค่อนข้างกลม สีข้างลำตัวกลม ไม่แผ่แบนออกด้านข้าง



การแพร่กระจายในพื้นที่

แยมี่เส้น .. พบได้ทั่วไปในประเทศไทยทุกภาค แม้กระทั่งตามเกาะแก่งต่าง ๆ กลางทะเล

จากการสำรวจในพื้นที่ศึกษาเขตป่าอนุรักษ์เขาพลวง ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนา ตำบลชัยบาดาล อำเภอยชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบแยมี่แพร่กระจาย โดยชูดรูอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาโดยรอบเขาพลวง และพื้นที่โดยรอบถนนภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนา ดังรูปด้านล่าง



ถิ่นที่อยู่อาศัย

แยมี่ เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทไต่คานที่ชูดรูอาศัย โดยพบได้ทั่วไปตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา รวมถึงพบได้ทั่วไปตามไร่ นา หรือที่รกร้างที่มีสภาพแล้ง มักชูดรูทำรังในดินที่มีลักษณะเป็นดินทราย

